

ACEDERM[®] HUIDSPRAY

DIERGEENESMIDDEL - HUIDSPRAY TER BEVORDERING VAN DE WONDGENEZING BIJ RUNDEREN, SCHAPEN, PAARDEN, HONDEN EN KATTEN

SAMENSTELLING

Per gram:

Werkzame bestanddelen:

Allantoïne	14 mg
Perubalsem	80 mg
Levertraanolie	300 mg

INDICATIE

Bevordering van de wondgenezing.

CONTRA-INDICATIES

Geen.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN VOOR ELKE DIERSOORT WAAR- VOOR HET DIERGEENESMIDDEL BESTEMD IS

Geen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK BIJ

DIEREN

Niet van toepassing.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN, TE NEMEN DOOR DEGENE DIE HET DIERGEENESMIDDEL AAN DE DIEREN TOEDIENT

Dit diergeneesmiddel wordt geleverd in een houder onder druk en is licht ontvlambaar. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp. Niet roken tijdens het gebruik van dit diergeneesmiddel.

BIJWERKINGEN

Geen bekend.

GEBRUIK TIJDENS DRACHT OF LACTATIE

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht en de lactatie.

INTERACTIES

Geen gegevens beschikbaar.

DOSERING EN TOEDIENINGSWEG

Voor uitwendig gebruik.

Goed schudden voor gebruik. Spray 2x daags op de wond.

Voor een optimale werking de wonden en directe omgeving reinigen met water en eventueel met een niet-irriterende vloeibare zeep alvorens te sprayen.

OVERDOSERING

Er is geen informatie beschikbaar.

WACHTTERMIJN

Nul dagen.

FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Farmacotherapeutische groep: Levertraan oliën

ATCvet-code: QD03AA

Farmacodynamische eigenschappen

Allantoïne is een lichaamseigen metaboliet die ontstaat na eiwitafbraak. Allantoïne en perubalsem hebben een positieve invloed op necrotische en etterende wonden door stimulatie van de wondgranulatie. Allantoïne bevordert eveneens de epithelisatie van ruwe en droge huid. Perubalsem heeft milde, desinfecterende eigenschappen. Levertraanolie heeft een wond reinigend, granulatie bevorderend en epitheliserend effect.

Farmacokinetische eigenschappen

Geen onderzoeksgegevens beschikbaar.



ONVERENIGBAARHEDEN

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

BEWARING

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 5 jaar.
Spuitsbus onder druk. Tegen direct zonlicht beschermen en niet blootstellen aan temperaturen

boven 50 °C. Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik. Het diergeneesmiddel uit de buurt van ontstekingsbronnen houden.

VERGUNNINGHOUDER

Ecuphar nv
Legeweg 157-i
8020 Oostkamp, België

ACEDERM[®] ZALF

DIERGEENESMIDDEL – ZALF TER BEVORDERING VAN DE WONDGENEZING BIJ RUNDEREN, SCHAPEN, PAARDEN, HONDEN EN KATTEN

SAMENSTELLING

Per gram:

Werkzame bestanddelen:

Perubalsem	100 mg
Allantoïne	20 mg
Levertraan	400 mg

VORM

Bruine zalf.

INDICATIE

Bevordering van de wondgenezing bij:

- verwondingen
- nabehandeling van operatieve wonden
- speen- en tepelaandoeningen
- tussenklauwaandoeningen
- droge en vochtige mok
- Caro Luxurians (wild vlees)
- hyperkeratose (verhoorning)

WERKING

- bevordert de epithelisering
- werkt antiseptisch
- normaliseert de granulatie
- remt de exsudaatvorming
- houdt de wond soepel
- remt de bacteriële groei

CONTRA-INDICATIES

Geen.

GEBRUIK EN DOSERING

Reinig de wond en directe omgeving met water en eventueel met een niet-irriterende vloeibare zeep.



Dep het wondoppervlak droog.

Twee- tot driemaal daags ruim opbrengen op de wonde.

BIJWERKINGEN

Geen.

WACHTTERMIJN

Nul (0) dagen voor melk en vlees voor alle voedselproducerende dieren.

VOORZORGSMAATREGEL

Aanwijzing voor de dierenarts: het verdient aanbeveling wondranden te scheren en purulente en losse necrotische delen te verwijderen vóór de behandeling.

BEWARING

Bewaren in de originele verpakking.

Niet bewaren boven 25°C.

Niet in koelkast of vriezer bewaren.

Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren.

VERGUNNINGHOUDER

Ecuphar nv

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

animal.health@ecuphar.be